

Se recomienda una tercera dosis al menos 4 semanas después de su primera vacuna Pfizer o Moderna cuando se aplique lo siguiente:

- ✓ Está usted tomando o le están dando medicamentos para cualquier tipo de **cáncer**
- ✓ Ha tenido usted algún tipo de **trasplante**, o está tomando o le están dando medicamentos para cualquier tipo de trasplante
- ✓ Tiene usted un problema grave con su **sistema inmunológico**
- ✓ Tiene usted **VIH o SIDA** que no está bajo control
- ✓ Está usted tomando **esteroides** todos los días (la prednisona es un ejemplo de esteroide), o
- ✓ Está usted tomando cualquier otro **medicamento** fuerte que, según el médico, **debilitará su sistema inmunológico**

Actualmente, la dosis de refuerzo no está aprobada para nadie que haya recibido la vacuna Johnson & Johnson.

### ¿Alguien puede recibir una tercera dosis?

Las terceras dosis no son para el público en general, sino que solo están destinadas a personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Solo son para personas inmunodeprimidas en estado de moderado a grave. Compartiremos más información a medida que la vayamos recibiendo.

### ¿Puedo recibir una dosis de refuerzo si mi primera vacuna fue Johnson & Johnson

No, porque no se ha aprobado la dosis de refuerzo para quienes hayan recibido la vacuna J&J en este momento.

### Si originalmente recibí la Moderna o Pfizer, ¿qué tipo de vacuna puedo recibir como refuerzo?

Las personas inmunodeprimidas de estado moderado a grave deben recibir una dosis de refuerzo de la misma vacuna que recibieron para su primera y segunda dosis. La aprobación para dosis de refuerzo se aplica específicamente para recibir una tercera dosis del mismo producto. Ofreceremos el mismo producto que se haya recibido antes bajo la orden permanente que estamos autorizados a seguir.

### ¿Qué sucede si recibí mi vacuna en un país diferente con una vacuna que actualmente no está aprobada en los Estados Unidos? ¿Puedo recibir una dosis de refuerzo en la Clínica Virginia García?

Esto depende completamente de la vacuna que usted haya recibido. Es posible que usted necesite una revisión del proveedor médico para decidir qué vacuna sería la apropiada. Hay alternativas sugeridas del mismo tipo de vacuna o similar que se pueden administrar en estas situaciones.

### ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un paciente entre las vacunas?

Para las personas inmunodeprimidas de estado moderado a grave, deben recibir una dosis de refuerzo 4 semanas (o más) después de su segunda dosis de la vacuna Moderna / Pfizer.

### ¿Estamos preocupados por edades específicas?

La aprobación por edad es específica de la vacuna. Si se recibió la vacuna Pfizer y uno se encuentra inmunodeprimido de estado moderado a grave, uno debe recibir la dosis de refuerzo de Pfizer.

### ¿Necesito traer mi tarjeta de las vacunas?

Traiga por favor su tarjeta de vacunación de Covid, esto puede agilizar el proceso y garantizar que le administremos la vacuna correcta en el momento adecuado.